

Are you pregnant? Or think you might be pregnant?

To ensure your safety, please inform the radiology technician before the procedure.

From 1 to 2 weeks **less risk**

From 3 to 15 weeks **moderate risk**

From 16 to 38 weeks **less risk**

What do you need to know?

- Unborn babies are more sensitive to radiation.
- Risk depends on the stage of pregnancy, type of procedure, and the amount of radiation used.
- Diagnostic radiological procedures are safe under most circumstances even during pregnancy.

General Guidelines:

- Don't avoid the procedure if it's important for your health.
- Do ask the radiology staff what measures will be taken to reduce any risks.
- Do seek advice before the procedure if you are concerned.
- Do ask if a pregnancy test is needed.

هل أنت حامل؟ أو تعتقدين أنك قد تكونين حامل؟

لضمان سلامتك، يرجى إبلاغ فني الأشعة قبل إجراء أي فحص في قسم الأشعة

من ١ إلى ٢ أسبوع أقل خطورة

من ٣ إلى ١٥ أسبوع خطورة متوسطة

من ١٦ إلى ٣٨ أسبوع أقل خطورة

ما يجب معرفته ؟

- الأطفال الذين لم يولدوا بعد أكثر حساسية إلى الأشعة
- تعتمد درجة خطورة الأشعة على مرحلة الحمل ونوع الإجراء و كمية الإشعاع المستخدم
- الإجراءات الإشعاعية التشخيصية آمنة في معظم الحالات حتى أثناء الحمل

تعليمات عامة:

- لا تتجنبي الإجراء إذا كان مهماً لصحتك
- اسألي المختصين في قسم الأشعة عن الإحتياجات و الإجراءات التي ستؤخذ للحد من أي خطورة
- اطلبي المشورة قبل إجراء الأشعة إذا كنت قلقة
- اسألي عما إذا كان هناك حاجة لإجراء اختبار الحمل